



## BLACK STRIPE USA E GETTA

*Per ambienti polverosi.*

### Caratteristiche

**BLACK STRIPE USA E GETTA** è una trappola brevettata per la cattura degli insetti che tipicamente infestano le derrate alimentari e cioè *Ephestia kuehniella*, *Ephestia cautella*, *Ephestia eleutella*, *Plodia interpunctella*, comunemente indicate come tignole, camole o farfalline della farina, del tabacco, dei cereali, ecc. I maschi di questi insetti vengono attratti da una capsula che rilascia gradualmente gli specifici feromoni di richiamo e sono quindi indotti a posarsi sulla trappola dal caratteristico disegno a strisce nere. Nel tentativo di raggiungere la fonte del feromone gli insetti restano attaccati allo strato collante. L'utilizzo più valido di questa trappola è per il controllo dell'infestazione, sia dal punto di vista della presenza o meno dell'infestazione stessa (la trappola segnala infatti la presenza degli insetti molto prima che essi siano palesemente visibili), sia per valutare l'andamento dell'infestazione mediante il conteggio, a intervalli regolari, del numero di catture. Con **BLACK STRIPE USA E GETTA** si può ottimizzare l'impiego di insetticidi, stabilendo razionalmente se e quando la disinfezione deve essere effettuata.

### Modalità di impiego

**MONTAGGIO** - Seguire le indicazioni contenute nel foglietto illustrativo.

**INSTALLAZIONE** - Appendere la trappola tramite l'apposito cordoncino ad una distanza da terra di 2-3 metri circa. E' opportuno installare la trappola non solo dove già si sospetta la presenza dell'infestazione, ma anche nei locali e nei corridoi circostanti.

**CAMBIO CAPSULA ATTRAENTE** - Una volta estratta dalla confezione protettiva, la capsula è attiva per circa 6 settimane. Le capsule di scorta vanno conservate in luogo fresco o, meglio ancora, in frigorifero; così conservate si mantengono attive per un periodo di almeno 18 mesi. Le capsule esaurite non devono restare all'interno dello stabilimento o magazzino, ma vanno immediatamente smaltite.

**RILEVAZIONE DATI** - E' fondamentale ispezionare le trappole e, nel caso siano stati catturati degli insetti, conteggiarli almeno una volta alla settimana trascrivendo i dati ottenuti.

Sostituire periodicamente il cartoncino collante in dipendenza del numero delle catture.

L'analisi dei dati di cattura costituisce il migliore strumento per stabilire qual è il momento di intervenire con un trattamento insetticida. Riportiamo di seguito a titolo esemplificativo alcuni valori di riferimento.

*Intervento richiesto quando le catture settimanali superano i seguenti valori:*

1 cattura: per magazzini di prodotti finiti e per industrie di produzione cioccolato

1 - 10 catture: per magazzini di materie prime, reparti di produzione in genere, negozi

10 - 15 catture: per molini in genere

50 e + catture: per industrie di preparazione mangimi per animali.

### Confezioni

10 trappole + 10 ricariche feromone

### Note

Informazioni riservate ai tecnici dei settori biocidi e protezione delle piante ed alle Autorità Sanitarie.

